

PROTOCOLO ESTUDIO OFTALMOPATIA TIROIDEA

edad	Diabetes					
raza	Estrés					
sexo	Comienzo OAT					
Fumador						
FACT. RIESGO	FECHA		FECHA		FECHA	
Inicio OAT/ HIPERT						
Status tiroideo						
Stma. De inicio						
Subjetivamente						
Laborat HHTT						
PX favor/desfavor						
Otras enfermedades						
CAS	OD	OI	OD	OI	OD	OI
dolor retroocular espontáneo						
dolor mov verticales ocul						
enrojecimiento palpebral						
enrojecimiento conjuntival						
inflamación palpebral						
inflamación caruncular						
edema conjuntival						
total max 7						
INDICE GRAVEDAD						
retraccion palpebral						
afección tejidos blandos						
exoftalmos						
diplopia						
exposición corneal						
GRAVEDAD EUGOGO						
AV OD/OI						
BMC						
prolap grasa(0-3) PS/PI						
Shirmer						
BUT						
Ojo seco(I-III)						
MOE						
RI/RM/RS/RL						
EXOF HERTEL						
PIO ppm OD/OI						
PIO suprav OD/OI						
HENDI. PALPEB						
RETRACC PS/PI	OD	OI	OD	OI	OD	OI
leve (limbo						
mode 2-4mm						
grave>4mm						
N.O.						
C.VISUAL						
TAC/RM						
TRATAMIENTOS						
QX						
OBSERVACIONES						
activo/estable/crónico						